

**ネオーラル内用液 10%**  
**ネオーラル 10mg カプセル**  
**ネオーラル 25mg カプセル**  
**ネオーラル 50mg カプセル**

**【この薬は？】**

販売名	ネオーラル内用液 10% Neoral Solution 10%	ネオーラル 10mg カプセル Neoral 10 mg Capsules	ネオーラル 25mg カプセル Neoral 25 mg Capsules	ネオーラル 50mg カプセル Neoral 50 mg Capsules
一般名	シクロスポリン Ciclosporin			
含有量	1mL 中	1 カプセル中		
	100mg	10mg	25mg	50mg

**患者向医薬品ガイドについて**

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

**【この薬の効果は？】**

- ・この薬は、免疫抑制剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は体内の免疫反応を抑制します。
- ・次の目的で処方されます。

1. 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制  
 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植

2. 骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制
3. ベーチェット病（眼症状のある場合）
4. 尋常性乾癬（皮疹が全身の 30%以上に及ぶものあるいは難治性の場合）、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬
5. 再生不良性貧血（重症）、赤芽球癆
6. ネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイドに抵抗性を示す場合）
7. 全身型重症筋無力症（胸腺摘出後の治療において、ステロイド剤の投与が効果不十分、または副作用により困難な場合）
8. アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）

- ・ネフローゼ症候群では、副腎皮質ホルモン剤で効果があるものの、たびたび再発を繰り返す人、または、副腎皮質ホルモン剤で効果が得られない人にのみ使用されます。
- ・アトピー性皮膚炎では、これまでのステロイド外用剤やタクロリムス軟膏などの治療では効果が不十分で、強い炎症（はれ、痛み）を伴う皮疹が体表面積の30%以上に及ぶ人に使用されます。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬をアトピー性皮膚炎で使用する患者の皆様や家族の方は、この薬の効果や副作用について、十分理解できるまで説明を受けてください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にネオオーラル内用液またはカプセルに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性がある人、授乳中の人
  - ・タクロリムス（外用剤を除く）、ピタバスタチン、ロスバスタチン、ボセンタン、アリスキレンを使用している人
  - ・肝臓または腎臓に障害のある人で、コルヒチンを使用している人
- 次の人は、原則として、この薬を使用することはできません。
  - ・神経ベーチェット病の人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
  - ・サンディミュン内用液またはカプセルから切り換えてこの薬を使用する人
  - ・腎臓に障害のある人
  - ・肝臓に障害のある人
  - ・すい臓に障害のある人
  - ・高血圧症の人
  - ・感染症にかかっている人
  - ・悪性腫瘍のある人または過去に悪性腫瘍があった人
  - ・PUVA（ソラレン長波長紫外線）療法を含む紫外線療法を受けている人
  - ・高齢の人
  - ・低出生体重児、新生児または乳児（アトピー性皮膚炎の人を除く）

- アトピー性皮膚炎で活動性の単純ヘルペス感染症がある人は、この薬を飲む前に医師に連絡してください。
- この薬には併用してはいけない薬[生ワクチン（乾燥弱毒性麻疹ワクチン、乾燥弱毒性風疹ワクチン、経口生ポリオワクチン、乾燥 BCG 等）、タクロリムス（外用剤を除く）（プロGRAF）、ピタバスタチン（リバロ）、ロスバスタチン（クレストール）、ボセンタン（トラクリア）、アリスキレン（ラジレス）]や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状やこの薬の血中濃度などにあわせて、医師が決めます。通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

#### 〔腎移植の場合〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	初期量（移植 1 日前から）	維持量
	体重 10kg あたり 0.45～0.6mL	体重 10kg あたり 0.2～0.3mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	初期量（移植 1 日前から）			維持量		
	体重 10kg あたり					
	4.5～6 カプセル	1.8～2.4 カプセル	0.9～1.2 カプセル	2～3 カプセル	0.8～1.2 カプセル	0.4～0.6 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

#### 〔肝移植の場合〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	初期量（移植 1 日前から）	維持量
	体重 10kg あたり 0.7～0.8mL	体重 10kg あたり 0.25～0.5mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	初期量（移植 1 日前から）			維持量		
	体重 10kg あたり					
	7～8 カプセル	2.8～3.2 カプセル	1.4～1.6 カプセル	2.5～5 カプセル	1～2 カプセル	0.5～1 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

〔心移植、肺移植、膵移植の場合〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	初期量 (移植 1 日前から)	維持量
	体重 10kg あたり 0.5~0.75mL	体重 10kg あたり 0.1~0.3mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	初期量 (移植 1 日前から)			維持量		
	体重 10kg あたり					
	5~7.5 カプセル	2~3 カプセル	1~1.5 カプセル	1~3 カプセル	0.4~1.2 カプセル	0.2~0.6 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

〔骨髄移植の場合〕

販売名	ネオーラル内用液 10%
1 回量	体重 10kg あたり 0.3~0.6mL
飲む回数	1 日 2 回

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	体重 10kg あたり 3~6 カプセル	体重 10kg あたり 1.2~2.4 カプセル	体重 10kg あたり 0.6~1.2 カプセル
飲む回数	1 日 2 回		

移植 1 日前から飲んで 3~6 ヶ月間飲み続け、その後徐々に減量し、中止します。

- ・臓器移植の人では、この薬を多く飲んだときの副作用、および飲む量が少なすぎたときの拒絶反応などを防ぐために、移植直後は頻回に、その後は 1 ヶ月に 1 回を目安に血中濃度を測定し、飲む量を調節します。医師の指示した受診日を守ってください。

〔バーチエット病の場合〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	初期量	維持量
	体重 10kg あたり 0.25mL	体重 10kg あたり 0.15～0.25mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	初期量			維持量		
	体重 10kg あたり					
	2.5 カプセル	1 カプセル	0.5 カプセル	1.5～2.5 カプセル	0.6～1 カプセル	0.3～0.5 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

〔乾癬の場合〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	初期量	維持量
	体重 10kg あたり 0.25mL	体重 10kg あたり 0.15mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	初期量			維持量		
	体重 10kg あたり					
	2.5 カプセル	1 カプセル	0.5 カプセル	1.5 カプセル	0.6 カプセル	0.3 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

〔再生不良性貧血の場合〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	体重 10kg あたり 0.3mL	
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	体重 10kg あたり 3 カプセル	体重 10kg あたり 1.2 カプセル	体重 10kg あたり 0.6 カプセル
飲む回数	1 日 2 回		

飲む期間は 8～16 週間が目安です。

〔ネフローゼ症候群（頻回再発型の場合）〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	成人	小児
	体重 10kg あたり 0.075mL	体重 10kg あたり 0.125mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	成人			小児		
	体重 10kg あたり					
	0.75 カプセル	0.3 カプセル	0.15 カプセル	1.25 カプセル	0.5 カプセル	0.25 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

〔ネフローゼ症候群（ステロイド抵抗性の場合）〕

販売名	ネオーラル内用液 10%	
1 回量	成人	小児
	体重 10kg あたり 0.15mL	体重 10kg あたり 0.25mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
1 回量	成人			小児		
	体重 10kg あたり					
	1.5 カプセル	0.6 カプセル	0.3 カプセル	2.5 カプセル	1 カプセル	0.5 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

〔全身型重症筋無力症の場合〕

販売名	ネオオーラル内用液 10%	
1 回量	初期量	維持量
	体重 10kg あたり 0.25mL	体重 10kg あたり 0.15mL
飲む回数	1 日 2 回	

時期	初期量			維持量		
販売名	ネオオーラル 10mg カプセル	ネオオーラル 25mg カプセル	ネオオーラル 50mg カプセル	ネオオーラル 10mg カプセル	ネオオーラル 25mg カプセル	ネオオーラル 50mg カプセル
1 回量	体重 10kg あたり					
	2.5 カプセル	1 カプセル	0.5 カプセル	1.5 カプセル	0.6 カプセル	0.3 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

〔アトピー性皮膚炎の場合〕

販売名	ネオオーラル内用液 10%	
1 回量	維持量	最高量
	体重 10kg あたり 0.15mL	体重 10kg あたり 0.25mL
飲む回数	1 日 2 回	

販売名	ネオオーラル 10mg カプセル		ネオオーラル 25mg カプセル		ネオオーラル 50mg カプセル	
1 回量	維持量	最高量	維持量	最高量	維持量	最高量
	体重 10kg あたり					
	1.5 カプセル	2.5 カプセル	0.6 カプセル	1 カプセル	0.3 カプセル	0.5 カプセル
飲む回数	1 日 2 回					

1 回の治療期間は 12 週以内が目安です。

- ・ベーチェット病、乾癬、再生不良性貧血、ネフローゼ症候群（頻回再発型、ステロイド抵抗性の場合）、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎の人では、副作用がおこるのを防ぐため、1 ヶ月に 1 回を目安に血中濃度を測定し、飲む量を調節します。医師の指示した受診日を守ってください。

●どのように飲むか？

〔ネオオーラルカプセル〕

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

〔ネオオーラル内用液〕

計量ピペットで飲む量をはかり、飲んでください。


<ネオオーラル内用液の計量ピペットの使い方>




薬液の入ったびんのキャップのふたをまっすぐ上に起こします。




ふたを矢印の方向にゆっくり口金を引いてください。(強く引きすぎると両端が切れてしまいます。また、口金の切断面に手を触れないよう注意してください)




- 矢印のように回して口金をはずしてください。
- ゴム栓を取り外してください。(ゴム栓は不要ですので捨ててください)




添付のケースからチューブ付きの中栓を取り出し、びんにしっかり装着してください。




ピペットを中栓の穴に差し込んで、指示された用量をはかります。




ピペット内の空気のあわが入ると正確にはかれませんので、ピペットの内筒を数回往復させてあわを排除します。(通常この操作は3~4回繰り返します)



- 使用後はピペットの外側を清潔な紙タオルなどで乾燥ふきとりして、ケースに戻します。(水洗いはしないでください)
- チューブ付きの中栓はびんに装着したままで添付のプラスチックキャップをしてください。



目盛を見るときは、ピペットをまっすぐ立ててください。



液量が少なくなったらびんを斜めにして静かに操作します。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回とばして次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

吐き気や嘔吐（おうと）、傾眠（眠気でぼんやりすること）、頭痛、頻脈（めまい、動悸（どうき））、血圧上昇などの症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、ただちに受診してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を飲んでいる間は、この薬の副作用を防ぐために、ネオオールの血中濃度を測定し、飲む量を調節することが望ましいため、医師が指示した受診日を守ってください。
- ・この薬の副作用として腎臓や肝臓、すい臓に障害がおこることがありますので、頻回に血液検査や尿検査が行われます。
- ・この薬により、体の抵抗力が弱まり、かぜなどの感染症にかかりやすくなったり、感染症が悪化することがあります。人混みを避けたり、外出後は手洗いやうがいをするなど感染症には気をつけてください。
- ・B型肝炎またはC型肝炎ウイルスキャリアといわれている人は、定期的な血液検査が行われます。B型肝炎ウイルスの再活性化またはC型肝炎の悪化が起こっていると思える症状（発熱、倦怠感（けんたいかん）、皮膚や白眼が黄色くなる、食欲不振など）があらわれた場合には、速やかに医師に連絡してください。
- ・この薬で血圧上昇がおこることがあり、可逆性後白質脳症候群、高血圧性脳症などにいたることもありますので、定期的に血圧測定が行われます。
- ・授乳を避けてください。
- ・グレープフルーツジュース、セイヨウオトギリソウ含有食品はこの薬の効果に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
腎障害 じんしょうがい	頭痛、顔のむくみ、眼がはれぼったい、尿量が減る
肝障害、肝不全 かんしょうがい、かんふぜん	からだがだるい、白眼が黄色くなる、吐き気、食欲不振、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、嘔吐（おうと）、羽ばたくような手のふるえ







<p>中枢神経系障害 (可逆性後白質脳症候群、高血圧性脳症など) ちゅうすうしんけいけいしょうがい (かぎやくせいこうはくしつとうしょうしょうこうぐん、こうけつあつせいのうしょう)</p>	<p>けいれん、意識の低下、考えがまとまらない、判断力の低下、視力の低下、ふらつき、ぼんやりする、意識がなくなる、しゃべりにくい、覚えられない、物忘れ、めまい、急激な強い頭痛、吐き気、手足のしびれ、ふるえ、集中力の低下、物事が思い出せない</p>
<p>神経ベーチェット病症状 しんけいベーチェットびょうしょうじょう</p>	<p>発熱、激しい頭痛、嘔吐(おうと)、半身の手足が動かなくなる</p>
<p>感染症 かんせんしょう</p>	<p>かぜのような症状、からだがだるい、発熱、嘔吐(おうと)</p>
<p>進行性多巣性白質脳症 しんこうせいたそうせいはいくしつとうしょう</p>	<p>ぼんやりする、ふらつき、覚えられない、物忘れ、けいれん、しゃべりにくい、意識がなくなる</p>
<p>BKウイルス腎症 びーけーういるすじんしょう</p>	<p>頭痛、顔のむくみ、眼がはれぼったい、尿量が減る</p>
<p>急性膀胱炎 きゅうせいすいえん</p>	<p>発熱、吐き気、嘔吐(おうと)、急に激しくおなかが痛む、急に激しく腰や背中が痛む</p>
<p>血栓性微小血管障害 (溶血性尿毒症症候群、血栓性血小板減少性紫斑病) けっせんせいびしょうけっかんしょうがい (ようけつせいにょうどくしょうしょうこうぐん、けっせんせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう)</p>	<p>血が出やすくなる、鼻血、歯ぐきの出血、内出血、血尿、けいれん、むくみ、発熱、意識の低下、考えがまとまらない、白眼が黄色くなる、尿量が減る</p>
<p>溶血性貧血 ようけつせいひんけつ</p>	<p>からだがだるい、ふらつき、疲れやすい、立ちくらみ、めまい、頭が重い、白眼が黄色くなる、動くときの動悸や息切れ、皮膚が黄色くなる、褐色尿</p>
<p>血小板減少 けっしょうばんげんしょう</p>	<p>鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい</p>
<p>横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう</p>	<p>脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、赤褐色尿</p>
<p>悪性リンパ腫 あくせいリンパしゅ</p>	<p>リンパ節のはれ、寝汗をかく、発熱、体重が減る、食欲不振</p>
<p>リンパ増殖性疾患 リンパぞうしょくせいしつかん</p>	<p>リンパ節のはれ、出血しやすい、発熱、貧血、食欲不振</p>
<p>悪性腫瘍(特に皮膚) あくせいしゅよう(とくにひふ)</p>	<p>ほくろがかゆい、ほくろから血が出る、ほくろが大きくなる、ほくろが痛い、ほくろが潰瘍になる、赤茶色のかさぶた</p>
<p>クリーゼ クリーゼ</p>	<p>息苦しい、激しい脱力感、飲み込みにくい、ぎこちない話し方、発音が不明瞭になる</p>

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、からだがだるい、脱力感、かぜのような症状、リンパ節のはれ、ふらつき、疲れやすい、体重が減る、寝汗をかく、けいれん、ふらつき、むくみ、立ちくらみ
頭部	急激な強い・激しい頭痛、頭が重い、めまい、立ちくらみ、ぼんやりする、意識がなくなる、意識の低下、考えがまとまらない
顔面	顔のむくみ、鼻血
眼	白眼が黄色くなる、眼がはれぼったい、視力の低下
口や喉	吐き気、嘔吐（おうと）、歯ぐきの出血、飲み込みにくい、ぎこちない話し方、発音が不明瞭になる、しゃべりにくい
胸部	動くときの動悸（どうき）や息切れ、息苦しい
腹部	食欲不振、吐き気、急に激しくおなかが痛む
背中	急に激しく腰や背中が痛む
手・足	半身の手足が動かなくなる、手足のしびれ・こわばり・ふるえ、羽ばたくような手のふるえ
皮膚	皮膚が黄色くなる、ほくろがかゆい、ほくろから血が出る、ほくろが大きくなる、ほくろが痛い、ほくろが潰瘍になる、赤茶色のかさぶた、内出血、あおあざができる、皮下出血
筋肉	筋肉の痛み
尿	尿量が減る、血尿、褐色尿、赤褐色尿、尿の色が濃くなる
その他	集中力の低下、物事が思い出せない・覚えられない、出血が止まりにくい、出血しやすい、物忘れ、判断力の低下

## 【この薬の形は？】

販売名	ネオーラル内用液 10%
形状	液剤 
色	微黄色～微黄褐色澄明

性状	油状の液で、粘性があり特異なおいがある		
販売名	ネオーラル 10mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
形状	楕円形の軟カプセル剤 	楕円形の軟カプセル剤 	楕円形の軟カプセル剤 
PTP シート			
長径	8.9mm	14mm	21.9mm
短径	6.7mm	8.2mm	8.5mm
重さ	0.2g	0.4g	0.8g
におい	特異なおい		
内容物	微黄色～微黄褐色澄明の油状の液で、粘性があり特異なおいがある		
識別コード	NVR 10	NVR 25 mg	NVR 50 mg

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	ネオーラル内用液 10%
有効成分	シクロスポリン
添加物	グリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、トコフェロール

販売名	ネオーラル 10 mg カプセル	ネオーラル 25mg カプセル	ネオーラル 50mg カプセル
有効成分	シクロスポリン		
添加物	グリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、トコフェロール		
	カプセル本体にゼラチン、グリセリン、プロピレングリコール、酸化チタン含有	カプセル本体にゼラチン、グリセリン、プロピレングリコール、酸化チタン、三酸化鉄含有	カプセル本体にゼラチン、グリセリン、プロピレングリコール、酸化チタン含有

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・ 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

[ネオーラルカプセル]

- ・ 飲む直前まで、薬の包装のまま保存してください。

[ネオーラル内用液]

- ・ 約20℃以下で保存するとゼリー状になることがありますので、その場合には20℃以上の室温で溶液に戻してから使用してください。

**●薬が残ってしまったら？**

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

**【この薬についてのお問い合わせ先は？】**

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ノバルティスファーマ株式会社

(<http://www.novartis.co.jp>)

ノバルティスダイレクト

電話：0120-003-293

受付時間：9時～18時

(土、日、祝日、会社休日を除く)